

A stylized blue syringe icon with the text "エンブレル 皮下注シリンジ" (Enbrel subcutaneous injection) written inside it.

エンブレル 皮下注シリンジ 自己注射確認チェックシート

このチェックシートは自己注射指導時に、
患者さんの自己注射に対する理解および
自己注射手順をご確認いただくためのものです。

自己注射確認チェックシート

氏名： _____ 様		/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
使用する製剤	投与回数	入院 / 外来	入院 / 外来	入院 / 外来	入院 / 外来
<input type="checkbox"/> 25mg	<input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週2回	-----	-----	-----	-----
<input type="checkbox"/> 50mg	<input type="checkbox"/> 週1回	練習 / 注射	練習 / 注射	練習 / 注射	練習 / 注射
● 自己注射について					
1. 自分の注射する1週間あたりの投与量と投与回数、曜日を理解している					
2. 体調の変化などに気づいたときに、すぐに主治医に連絡することや連絡方法を理解している					
3. 注射のしかたに関する問い合わせ先として「Enライン24」への連絡方法を理解している					
● 注射の準備					
1. シリンジをあらかじめ室温にもどしておくことを理解している					
2. 注射の準備を始める前に手洗いをすることを理解している					
3. シリンジ、アルコール綿、Eグリップを準備し、配置用マットに並べることができる					
● 注射する部位について					
1. 注射する部位（腹部、太もも、上腕部など）がどこかを理解している					
2. 毎回違う部位（腹部、太もも、上腕部など）を選ぶことを理解している（同じ部位に注射する場合は、前回の注射部位より3cm離す）					
● 注射のしかた					
1. 針キャップを横にまっすぐ安全にはずすことができる { <input type="checkbox"/> 手 <input type="checkbox"/> Eグリップ }					
2. 注射する部位をアルコール綿で消毒することができる					
3. 指示された方法で注射針を刺し、注射することができる { <input type="checkbox"/> 手 <input type="checkbox"/> Eグリップ }					
4. 注射後、注射針を抜きアルコール綿で軽く押さえることができる					
5. 注射した部位をもんではいけないことを理解している					
● 注射が終わったら					
1. <Eグリップを使う場合>Eグリップから安全にシリンジを取り出すことができる					
2. 使用済みのシリンジは、医療機関から指示された方法に従って処分することができる					
3. 使っていないシリンジは凍結を避け、冷蔵庫に保管することを理解している					
4. 注射後、必ず患者手帳に注射の記録をすることを理解している					
備考欄					
確認者サイン					